

# DOSING GUIDE

# GUÍA DE DOSIFICACIÓN

Cattle Body Weight (bw) Peso corporal (pc) del ganado	Dosage/head – Dosis/cabeza 5 mg/lb bw – 5 mg/lb de pc
100 lbs	2 mL
200 lbs	4 mL
400 lbs	8 mL
800 lbs	16 mL
1,000 lbs	20 mL
1,200 lbs	24 mL
1,400 lbs	28 mL
1,500 lbs	30 mL
1,600 lbs	32 mL

## Mixing, Administration and Storage:

1. Transfer 79 mL of sterile water into the bottle of POLYFLEX®.
2. Gently shake the bottle to rehydrate 100 mL of POLYFLEX.
3. Administer intramuscularly at 2 mL per 100 lbs. of body weight.
4. After rehydration, store in a refrigerator for up to 3 months.

**Residue Warnings:** Do not treat cattle for more than 7 days. Milk from treated cows must not be used for food during treatment, and for 48 hours (4 milkings) after the last treatment. Cattle must not be slaughtered for food during treatment, and for 144 hours (6 days) after the last treatment.

## Mezcla, administración y almacenamiento:

1. Transfiera 79 mL de agua estéril al frasco de POLYFLEX®.
2. Agite suavemente el frasco para rehidratar 100 mL de POLYFLEX.
3. Administre por vía intramuscular a razón de 2 mL por cada 100 lb de peso corporal.
4. Después de la rehidratación, almacene en un refrigerador durante un máximo de 3 meses.

**Advertencias sobre residuos:** No trate al ganado durante más de 7 días. La leche de las vacas tratadas no debe utilizarse como alimento durante el tratamiento ni durante las 48 horas (4 ordeños) posteriores a la última administración. El ganado no debe sacrificarse para consumo humano durante el tratamiento ni dentro de las 144 horas (6 días) posteriores a la última administración.



For more information, including full prescribing information, visit <https://bit.ly/3EtN2Ib> or call 888-637-4251.